



GUIDA INFORMATIVA ALL'UTILIZZO DEGLI OPIACEI





Altro **possibile effetto indesiderato** è la **stitichezza**: in questo caso è utile bere molto, **arricchire la dieta** con fibre ed eventualmente, al bisogno, ricorrere all'utilizzo di un lassativo.



Oggi sono disponibili nuove formulazioni di analgesici oppiacei studiate per ridurre e prevenire la stipsi.

Per quanto tempo lo posso assumere?

Dipende...

Calendario

Finché il dolore persiste e se la terapia è ben tollerata il trattamento può proseguire, con controllo medico periodico.

Ciò avviene soprattutto nelle condizioni di **dolore cronico**.

La **parola oppiaceo** mi fa pensare ad una **droga**.

Questo medicinale è come la morfina?

Avrò problemi a sospenderlo?

Può dare dipendenza psicologica?

Anche queste sono **false convinzioni**.

Nei pazienti con dolore e senza pregresse storie di abuso di droghe e/o di alcool, **gli analgesici oppiacei non provocano dipendenza psicologica**.

Invece è dimostrato che i pazienti in trattamento cronico con oppiacei, hanno una migliorata qualità di vita e un migliorato stato cognitivo legato ad un più adeguato controllo del dolore.

Essendo farmaci che agiscono a carico del SNC, quando si decide di sospendere la terapia, dopo lunghi periodi di trattamento è consigliato evitare di farlo bruscamente.

È opportuno ridurre il dosaggio con gradualità per evitare possibili sintomi da **sospensione improvvisa**, d'altronde come per tantissimi altri farmaci, ad es. gli anti-ipertensivi, gli antiaritmici, gli anticoagulanti, etc.

